Новосибирск, ул.Максима Горького, д.39, оф 303
Тел.+7 (383) 280 4611
Москва, ул. Складочная, д.5, стр.1
Тел.+7 (495) 668 1193

Советы фермеров по обслуживанию:

Совет № 1 от Виктора: «Я постоянно контролирую толщину подстилки и влажность в помещении. Если опилки сильно слеживаются от веса животного, то подсыпаю свежие до исходной толщины и перекапываю. Важно, чтобы подстилка не становилась влажной. Если в помещении очень влажно, тогда в нем стоит сделать хорошую вытяжку».

Совет № 2 от Марии: «Для птиц лучше использовать слой подстилки не менее 25 см. Когда подстилка слеживается, то подсыпаю свежие опилки. Если снижается температура, то развожу коровий или куриный навоз в воде и проливаю по всей подстилке. Перекапываю вместе со свежими опилками».

Совет № 3 от Валентины Николаевны: «У меня был случай, когда я забыла закрыть дверь в свинарнике зимой в -21С и подстилка остыла от мороза. Чуть животных не угробила! Пришлось экстренно реанимировать бактерии, чтобы они заработали. Чем раньше, вы начнете спасение (максимум 2-3 дня с момента остывания температуры), тем выше вероятность активизации бактерий. Я взяла готовый навоз 2-3 кг перемешала с отрубями (200-300 грамм). В полученную смесь добавила бактерии 20-30 гр и долила воды. Потом перемешала весь раствор со свежими опилками. Утрамбовала все это в ведре так, чтобы поступал воздух. И отставила на 1-2 дня в тепле: чтобы бактерии активизировались в ведре. Потом готовую смесь рассыпала и перекопала вилами по всей поверхности остывшей подстилки. Через 2-3 дня бактерии начали работать».

Совет № 4 от Ирины: “Советую перед запуском бактерии в зимнее время хорошо почистить помещение и проверить все стенки на наличие промерзаний с улицы. Если есть промерзлость, нужно предварительно утеплить стенки, т.к. бактерии боятся сильных морозов. Перед активацией бактерий помещение лучше нагреть не менее чем +5 градусов за день до запуска уже вместе с опилками. Главное, чтобы опилки были не промерзшие. По обслуживанию 1 раз в 2-3 недели я добавляю свежие опилки и контролирую, чтобы подстилка не слеживалась. Если вижу, что слой начинает остывать, то немного добавляю 20 грамм бактерий вместе с отрубями.

Совет № 5 от Екатерины: “Для КРС советую делать хороший дренаж с небольшим уклоном в сторону кормушки, т.к. от коров появляется много мочи. Советую увеличить площадь для коровы на одну голову до 13-18 м2. Толщину подстилки я использую примерно 50-60 см и периодически подсыпаю свежие опилки по мере её слеживания, потом перекапываю.

Совет № 6 от Олега: “В свинарнике, где свиньи ходят в туалет, я добавляю больше бактерий и при перекапывании стараюсь раскидывать навоз из одного места по всей подстилке. Смотрю, чтобы на подстилке не было лишних отходов от еды — только навоз. И конечно контролирую влажность: в свинарнике должны работать вытяжки, иначе подстилка станет мокрой. Чем больше слой, тем дольше активность бактерий. Поэтому сделал примерно 55-60 см толщину подстилки и остался доволен. Еще есть важный момент: опилки сильно мелкой фракции лучше не использовать. Стоит подсыпать свежие опилки до исходного слоя по мере слеживания подстилки, а потом перекопать.

Новосибирск, ул.Максима Горького, д.39, оф 303
Тел.+7 (383) 280 4611
Москва, ул. Складочная, д.5, стр.1
Тел.+7 (495) 668 1193

7 причин, почему подстилка может стать влажной?

Чтобы животные не болели и оставались чистыми на подстилке, важно соблюдать гигиенические требования. Ферментационная подстилка должна быть сухой, без запаха и удерживать тепло. Какие причины приводят к тому, что она влажная и превращается в болото?

1.Слабая вытяжка. Если на стенах появляется конденсат и стекает в подстилку, то налицо эффект росы. С помощью вытяжки контролируйте влажность — норма 40-50%. Достаточная вентиляция и приток свежего воздуха помогут решить эту задачу.

2.Высокая плотность животных на 1 м2. Самая распространенная причина хлюпанья на подстилке — перенаселенность. Важно соблюдать рекомендации производителя бактерий. См. таблицу учета плотности животных в упаковке. Если нет возможности расселить животных, то нужно сделать дренаж или увеличить слой подстилки до 60-80 см. Это актуально для КРС, свиней и лошадей.

3.Промерзает стена. Ферментационная подстилка может отсыревать, если какая-то часть стены промерзает. Утеплите внешнюю или внутреннюю стороны. Помните, что снижение температуры влияет на энергичность и вес животных.

4.Капает вода с поилок. Следите за тем, чтобы на подстилку не капала вода. Чрезмерная влажность вредит активности бактерий.

5.Не перекапывали подстилку. Для ферментации обязательно нужно перекапывать подстилку раз в 3-4 дня. Чтобы помнить о дне перекапывания, лучше завести график в тетради. Вскапывание должно быть на 25-40 см вглубь. Если пропускать участки и поверхностно взрыхлять подстилку, то бактерии не активизируются.

6.Не добавляли свежих опилок. Важно следить за высотой подстилки. Не экономьте на добавлении свежих опилок! Раз в 2-3 недели нужно досыпать органический материал до нужной высоты — 50 см и выше (зависит от вида животного). Учитывайте, что новый слой быстро оседает, поэтому желательно добавлять на 5-10 см больше рекомендуемой высоты.

7.Очень мелкие опилки. Рекомендуется использовать опилки средней фракции, только не мелкие (стертые в пыль). Зимой лучше дать опилкам отлежаться и прогреться. Можно перемешать со стружкой. Важно, чтобы в ней не было машинного масла, так как любая химия убивает бактерии.

Дорогие клиенты! Рекомендуем перед запуском выяснить детали. Варианты:

1. позвонить по телефону в службу поддержки **8(800)777-05-18**
2. посмотреть видеоролики по запуску или обслуживанию на нашем канале в ютубе.